

Bruxelles, le 08 mai 2020

À l'attention des médecins, sages-femmes
et infirmiers vaccinateurs de la F W-B

Concerne : Retour de la disponibilité du vaccin Gardasil9®

Fin janvier, nous vous annoncions qu'en raison d'une indisponibilité temporaire au niveau mondial, la possibilité de commander le vaccin Gardasil9® était gelée jusqu'en mai 2020 au moins, et ce, pour tous les vaccinateurs à l'exception des Services et Centres en charge de la Promotion de la Santé à l'École afin qu'ils puissent assurer un schéma complet de vaccination des élèves inscrits jusqu'à la fin juin.

Aujourd'hui, nous vous informons que **des doses de vaccins Gardasil9® sont désormais disponibles** en nombre suffisant que pour assurer les besoins de l'ensemble des vaccinateurs.

Par conséquent, **vous avez à nouveau la possibilité de commander ce vaccin** inclus dans le Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles **pour les adolescents filles et garçons à l'âge de 13-14 ans.**

Toutefois, afin de ne pas pénaliser ceux dont l'âge dépasse aujourd'hui les **15 ans** mais qui auraient dû être vaccinés pendant la période d'indisponibilité temporaire, **vous pouvez exceptionnellement vacciner ces adolescents** en utilisant les vaccins du Programme.

Nous vous invitons également à **prioriser les vaccinations relatives à la 2^{ème} ou 3^{ème} dose¹** de vaccin qui aurait dû être administrée dans un délai de 6 mois après la précédente, de sorte de rester dans un intervalle maximal de **12 mois²**.

Pour toutes questions supplémentaires, contactez-nous à l'adresse vaccination@one.be

M. François Claerhout

Directeur des Consultations et Visites à Domicile
ONE

Dr. Paloma Carrillo-Santistev

Responsable du Programme de vaccination de la F W-B
Direction Santé ONE

¹ Cependant, nous soulignons que, si le schéma requis était initialement prévu en trois doses après 15 ans, il est désormais demandé aux médecins de réaliser un schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle, et ce pour tous les adolescents jusqu'à 18 ans. En effet, selon des études récemment publiées, un tel schéma confère une protection suffisante et efficace. Il en résulte que l'administration d'une 3^{ème} dose n'est donc plus nécessaire que dans l'hypothèse où l'intervalle entre les deux premières doses n'a pas atteint un minimum de 5 mois.

² Selon la fiche technique du produit, la dernière dose du schéma HPV doit idéalement être réalisée dans les 13 mois qui suivent la première dose. Si ce n'est pas possible, elle peut être réalisée plus tard, dès que possible, et sans devoir recommencer un schéma complet. Les conséquences de l'interruption du schéma engendrent un risque de protection insuffisante pendant la période entre les 2 doses.