

Bruxelles, le 1^{er} juin 2023

PROGRAMME DE VACCINATION DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES (F W-B)
Chaussée de Charleroi, 95
1060 BRUXELLES

Chers professionnels vaccinateurs,

Concerne : Marché public d'achat et de livraison des vaccins 2023-2027

Nous vous informons par la présente qu'un nouveau marché public d'achat et de livraison de vaccins va débuter à partir du 1^{er} septembre 2023.

En effet, tous les quatre ans, le marché public d'acquisition des vaccins mis à disposition dans le cadre du Programme de vaccination de la F W-B est renouvelé.

En fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, de l'épidémiologie en Belgique et des offres remises par les firmes pharmaceutiques, des produits similaires ou nouveaux peuvent être disponibles à travers le Programme de vaccination.

Par conséquent, à partir du 1^{er} septembre 2023, les produits fournis lors des commandes passées sur la plateforme e-vax (voie informatique) ou via la Cellule de Vaccination de l'ONE (formulaire papier) seront les suivants :

<u>Pathologies couvertes</u>	<u>Produit disponible lors du marché 2019-2023</u>	<u>Produit disponible lors du marché 2023-2027</u>
Hépatite B	Engerix-B© (GSK)	Engerix-B© (GSK)
Papillomavirus Humain (HPV)	Gardasil9© (MSD)	Gardasil9© (MSD)
Poliomyélite-Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Haemophilus Influenzae type B - Hépatite B (hexavalent)	Hexyon© (SANOFI)	Vaxelis© (MSD)
Poliomyélite	Imovax Polio© (SANOFI)	/
Rougeole-Rubéole-Oreillons	MMR-Vax© (MSD)	MMR-Vax© (MSD)
Méningites	Neisvac© (MSD)	Nimenrix© (PFIZER)
Pneumocoque	Prevenar 13© (PFIZER)	Prevenar 13© (PFIZER)
Poliomyélite-Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (tétravalent)	Tetravac© (SANOFI)	Infanrix IPV© (GSK)
Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (trivalent faiblement dosé)	Triaxis© (SANOFI)	Boostrix© (GSK)

Il y a donc plusieurs changements à souligner :

- Vaccination contre Poliomyélite-Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Haemophilus Influenzae type B - Hépatite B (hexavalent) : passage de l'Hexyon® vers le Vaxelis®

Il est néanmoins conseillé d'utiliser autant que possible le même vaccin pour les trois premières doses. Si la vaccination a été initiée avec Hexyon®, il est donc recommandé de continuer avec ce vaccin pour les doses 2 et 3. Néanmoins, dans le cadre de cette transition, si la poursuite de la vaccination avec Hexyon® n'est pas possible, Vaxelis® peut être utilisé¹. En effet, ces vaccins peuvent être considérés comme interchangeables.

Vaxelis® peut par contre être utilisé systématiquement pour la dose de rappel à 15 mois. L'utilisation d'un vaccin différent pour la dose de rappel a en effet été étudiée et les données d'immunogénicité et de tolérance sont similaires qu'en cas d'usage d'un même vaccin tout au long du schéma².

- Vaccination contre la Poliomyélite : l'Imovax Polio® ne sera plus fourni dans le cadre du Programme de vaccination

Il n'y a en effet pas eu d'offre de la part des firmes pharmaceutiques pour ce vaccin monovalent contre la poliomyélite. Le vaccin Imovax Polio® ne sera donc plus disponible dans le cadre du Programme de vaccination de la F W-B.

Afin de compléter un schéma entamé ou de mettre en ordre une personne contre la poliomyélite seule, le vaccin devra désormais être acheté en pharmacie.

- Vaccination contre les Méningites : passage du Neisvac® vers le Nimenrix®

Suite à la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé de remplacer la vaccination contre la méningite C à 15 mois par une vaccination contre les méningites ACWY, le vaccin choisi dans le cadre du Programme de vaccination est le Nimenrix®.

La recommandation existant depuis 2019 et l'utilisation déjà importante de vaccins contre les méningites ACWY sur le terrain poussent le Programme de vaccination à recommander la conduite suivante :

- Limiter au maximum les commandes du vaccins Neisvac® jusqu'au 1^{er} septembre 2023 de sorte à aboutir au plus faible stock possible³ ;

¹ Interchangeabilité de vaccins. INFOVAC-FRANCE. Avril 2019. Disponible sur : <https://www.infovac.fr/docman-marc/public/fiches/1493-fiche-interchangeabilite/file>.

Etude sur l'interchangeabilité de la primovaccination: Martín-Torres, F., et al., Immunogenicity and safety of a new hexavalent vaccine (DTaP5-IPV-HB-Hib) administered in a mixed primary series schedule with a pentavalent vaccine (DTaP5-IPV-Hib). Vaccine, 2017. 35(30): p. 3764-3772.

² Etudes disponibles sur l'interchangeabilité pour la dose de rappel : Marshall, G.S., et al., Immunogenicity, Safety, and Tolerability of a Hexavalent Vaccine in Infants. Pediatrics, 2015; Block, S.L. et al. Lot-to-lot Consistency, Safety, Tolerability and Immunogenicity of an Investigational Hexavalent Vaccine in US Infants. The Pediatric Infectious Disease Journal, 2017.

³ Pour les commandes sur formulaire papier utilisant les vignettes du carnet de santé, veuillez barrer la mention « Méningo » sur la vignette à 15 mois afin de s'assurer que lors de la livraison vous receviez uniquement des doses de vaccin Hexavalent (Hexyon®).

- A partir du 1^{er} septembre 2023, jeter le stock résiduel de Neisvac© et utiliser à la place le vaccin Nimenrix© qui couvre plus de souches.

Il n'est malheureusement pas possible de rapatrier et d'utiliser les stocks résiduels de Neisvac©. Nous vous encourageons par contre à répartir d'éventuels stocks surnuméraires en votre possession avec vos collègues à proximité qui se trouveraient dans une situation inverse.

L'utilisation du vaccin pour protéger contre les méningites ACWY est limitée :

- à la vaccination des enfants à 15 mois contre les maladies méningococciques invasives dues aux Neisseria meningitidis des groupes A, C, W135 et Y.

- au rattrapage des enfants, jusqu'à 7 ans, qui n'ont reçu aucun vaccin contre les maladies méningococciques invasives (que ce soit des groupes C ou ACWY) auparavant.

- Vaccination contre Poliomyélite-Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTaP-IPV, tétravalent) : passage du Tetravac© à l'Infanrix IPV©

Il n'y a pas de précaution particulière à prendre, les vaccins sont interchangeables. Il convient donc de terminer le stock de Tetravac© et d'utiliser ensuite le vaccin Infanrix IPV©.

- Vaccination contre Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (dTap, trivalente faiblement dosée) : passage du Triaxis© au Boostrix©

Il n'y a pas de précaution particulière à prendre, les vaccins sont interchangeables. Il convient donc de terminer le stock de Triaxis© et d'utiliser ensuite le vaccin Boostrix©.

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse Commande.vaccins@one.be.

En vous remerciant de l'attention réservée à ces informations, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.

M. François Claerhout

Directeur de la Direction des Consultations
et Visites à domiciles ONE

Responsable logistique et financier du
Programme de vaccination de la F W-B

Dr. Paloma Carrillo-Santistevé

Médecin adjoint à la Direction Santé ONE

Responsable médicale du Programme de
vaccination de la F W-B