

RATTRAPAGE DES VACCINATIONS - 2021

Suite à la crise sanitaire engendrée par la Covid-19, il est possible que certains patients aient raté un moment de vaccination prévu dans le calendrier vaccinal.

Nous attirons dès lors votre attention sur l'importance de vérifier leur statut vaccinal et de les inviter, si nécessaire, à compléter les schémas entamés et/ou recevoir les doses manquantes.

CALENDRIER DE VACCINATION

2021-2022

		Nourrissons					Enfants et adolescents				Adultes		
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois ¹	5-6 ans	7-8 ans ²	13-14 ans	15-16 ans	Femmes enceintes	Tous les 10 ans	65 ans
Poliomyélite	Hexavalent	✓	✓	✓		✓							
Diphtérie											✓	✓	
Tétanos											✓	✓	
Coqueluche											✓	✓	
<i>Haemophilus influenza</i> de type b											✓	✓	
Hépatite B											✓	✓	
Rougeole	RRO				✓								
Rubéole					✓								
Oreillons					✓								
Méningocoque C					✓								
Pneumocoque		✓	✓ ¹	✓	✓							✓	
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	✓ ³									
Papillomavirus (HPV)								✓	✓ ⁴				
Grippe (Influenza)										✓ ⁶		✓	

-  Recommandé à tous et gratuit
-  Recommandé à tous
-  Vaccin combiné (une seule injection)

¹ Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningocoque C).

Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

- ² Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n'ont pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à 11-12 ans.
- ³ En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
- ⁴ Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).
- ⁵ A partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.
- ⁶ Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse

Le Conseil supérieur de la Santé recommande :

- De considérer qu'une personne n'est pas vaccinée plutôt que de la croire erronément protégée. Il est donc préférable de vacciner en l'absence d'information sûre sur une précédente administration du vaccin.
- S'il y a une interruption dans le schéma de vaccination, de ne pas recommencer toute la série de vaccins, ni d'y ajouter des doses supplémentaires. Les doses déjà administrées sont des doses à prendre en compte.
- De prendre en compte que la qualité de la réponse immunitaire obtenue dépend du respect de l'âge minimum lors de l'administration de la première dose de vaccin, de l'intervalle minimal entre deux doses et du nombre de doses reçues y compris le ou les rappels pour certains vaccins.
- D'utiliser des vaccins combinés qui favorisent généralement une meilleure compliance en réduisant le nombre total d'injections nécessaires.

Plus d'informations sur les schémas de vaccination de rattrapage sont disponibles dans l'avis 9111 du CSS de 2013.

Les vaccins mis gratuitement à disposition (édition septembre 2021) :

Les vaccins mis gratuitement à disposition dans le cadre du Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent être utilisés pour ces rattrapages selon les directives suivantes (vous pouvez trouver plus d'informations sur les recommandations d'utilisation des vaccins sur la page d'accueil du site www.e-vax.be).

	 0-2 ans	 3-12 ans	 13-18 ans	 18-20 ans	 Femme enceinte
MMR VaxPro®	Schéma en 2 doses à 1 mois d'intervalle minimum. Avant 11 mois de vie, la dose ne compte pas, refaire un schéma complet.				
Gardasil 9® : schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle.			Schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle ¹ . <i>Pour tous les enfants nés à partir de 2006.</i>		
Triaxis®			1 dose de rappel ou en fonction du schéma de rattrapage.		1 dose
Engerix-B®		Schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle entre 11 et 15 ans inclus et en 3 doses (0-1-6) à partir de 16 ans.			
Tetravac®	1 dose ou en fonction du schéma de rattrapage.				
Neisvac-C®	1 dose				
Hexyon®	En fonction du schéma de rattrapage jusque maximum 6 ans .				
Prevenar 13®	Jusqu'à 24 mois maximum.				
Imovax Polio®	En fonction du schéma de rattrapage.				

1. Il n'y a pas d'intervalle maximale : si plus de 6-12 mois sont passés depuis la première dose, compléter le schéma dès que possible sans ajouter des doses. Jusqu'au 18 ans révolus, le schéma préconisé est de deux doses de vaccin (fiche 9606 du CSS de 2021 sur le calendrier vaccinal de base).

Pour rappel, vous pouvez commander les vaccins via la plateforme e-vax.

Quelques outils :

L'ONE, en collaboration avec l'AVIQ, Kaleïdo et la Cocom, a élaboré des fiches-outils pour vous aider dans la communication avec le patient autour des questions relatives à la vaccination.

Comprenant des éléments de réponses claires et succincts, des informations complémentaires sur la question abordée et des conseils de communication, ces fiches sont disponibles sur la page d'accueil du site www.e-vax.be.

Pour aider vos patients à trouver l'information pertinente sur la vaccination :

Une question sur la vaccination ?

Disponible sur le site www.vaccination-info.be

DR PALOMA CARRILLO-SANTISTEVE
Responsable programme de vaccination FW-B
vaccination@one.be