

## Cadre d'utilisation des vaccins du Programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles

**Tous les vaccinateurs** (médecins généralistes, pédiatres et gynécologues, sages-femmes...) ainsi que les structures préventives (consultations de nourrissons, services PSE et CPMS-CF, consultations prénatales et centres de planning familial...) **peuvent commander gratuitement les vaccins du Programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles**. Ces vaccins peuvent être commandés pour la vaccination des enfants de 0 à 18 ans, des étudiants inscrits dans l'Enseignement Supérieur Non-Universitaire (ESNU) et des femmes enceintes.

**Ces vaccins doivent être réalisés aux âges recommandés dans le calendrier vaccinal du Programme**. En dehors des âges recommandés et du public déterminé, les vaccins gratuits du Programme ne peuvent être utilisés mais doivent être prescrits au patient afin qu'il se les procure en pharmacie.

**Remarque** : en cas d'épidémie, il est possible que le cadre d'utilisation de certains vaccins soit modifié. Plus d'informations sur e-vax.

VACCINS DISPONIBLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE VACCINATION DE LA F W-B	PRÉVU POUR	PAS PRÉVU POUR
<a href="#">Engerix-B®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre l'hépatite B (VHB) des élèves de 6<sup>ème</sup> primaire qui n'auraient pas reçu cette vaccination enfant (schéma 2 doses)</li> <li>la vaccination contre l'hépatite B (VHB) des enfants âgés de 11 à 15 ans n'ayant pas reçu cette vaccination enfant (schéma en 2 doses)</li> <li>la vaccination de rattrapage des étudiants dans l'Enseignement Supérieur Non-Universitaire (ESNU) (schéma en 3 doses)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre l'hépatite B (VBH) des adultes</li> </ul>
<a href="#">Gardasil 9®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) des élèves de 1<sup>ère</sup> différenciée ou de 2<sup>ème</sup> secondaire (indépendamment de l'âge)</li> <li>la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) des adolescents de 13-14 ans inclus</li> <li>la vaccination de rattrapage contre le papillomavirus humain (HPV) des adolescents nés à partir de 2006 (cohortes ciblées par le Programme de vaccination de la FW-B) (schéma en 2 doses selon recommandation du CSS avis 9606)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre HPV des adolescents nés avant 2006</li> </ul>
<a href="#">Hexyon®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la primo-vaccination contre la poliomyélite (vaccin inactivé), la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (vaccin acellulaire), l'hépatite B et l'<i>haemophilus influenzae</i> de type B des nourrissons</li> <li>la vaccination de rappel contre 6 maladies jusqu'à l'âge de 5 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre ces 6 maladies au-delà de 5 ans</li> </ul>

	PRÉVU POUR	PAS PRÉVU POUR
<a href="#">Imovax Polio®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la primo-vaccination contre la poliomyélite (vaccin inactivé) des enfants qui pour une raison quelconque, ne peuvent pas recevoir les autres vaccins recommandés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la primo-vaccination des adultes au-delà de 20 ans</li> </ul>
<a href="#">MMR VaxPro®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons des enfants à 12 mois et à 7 et 8 ans</li> <li>la vaccination de transition contre la rougeole, la rubéole et les oreillons des enfants de 11 et 12 ans</li> <li>la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons des enfants entre 6 et 12 mois en cas d'épidémie ou s'ils se rendent dans un pays endémique. La dose donnée avant 1 an est considérée comme une extra dose et ne remplace pas celle qui doit être administrée à 12 mois</li> <li>la vaccination de rattrapage entre 12 mois et 12 ans pour tout enfant qui n'a pas reçu sa première dose</li> <li>la vaccination de rattrapage entre 11 ans et 20 ans pour toute personne qui n'a pas reçu les 2 doses de vaccin contre RRO</li> <li>la vaccination de rattrapage des étudiants inscrits dans l'Enseignement Supérieur Non-Universitaire (ESNU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination des adultes au-delà de 20 ans</li> </ul>
<a href="#">Neisvac-C®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination contre le méningocoque C (MenC) des enfants à 15 mois</li> <li>la vaccination de rattrapage contre la méningite jusqu'à 20 ans inclus</li> <li>la vaccination post-exposition des élèves (jusqu'à la fin des secondaires) autour d'un cas identifié de Méningite à Méningocoque C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination des adultes au-delà de 20 ans</li> </ul>
<a href="#">Prevenar 13®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la primo-vaccination contre le pneumocoque</li> <li>la vaccination de rattrapage des enfants jusqu'à 24 mois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination au-delà de l'âge de 24 mois</li> </ul>
<a href="#">Tetravac®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination de rappel contre la diphtérie, la coqueluche (vaccin acellulaire), le tétanos et la poliomyélite (vaccin inactivé) à 5-6 ans</li> <li>la vaccination de rattrapage en 2<sup>ème</sup> primaire</li> <li>la vaccination de rattrapage des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination des enfants au-delà de l'âge de 13 ans</li> </ul>
<a href="#">Triaxis®</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (vaccin acellulaire) pour les élèves de 4<sup>ème</sup> secondaire (adolescents de 15-16 ans) ainsi que pour les élèves jusqu'à la fin de l'enseignement ordinaire qui n'ont pas reçu la dose en 4<sup>ème</sup> secondaire</li> <li>la vaccination de rappel de l'adolescent jusqu'à 20 ans</li> <li>la femme enceinte entre la 24<sup>ème</sup> et 32<sup>ème</sup> semaine de grossesse, à chaque grossesse</li> <li>la vaccination de rattrapage des étudiants inscrits dans l'Enseignement Supérieur Non-Universitaire (ESNU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche tous les dix ans chez l'adulte</li> <li>la vaccination « cocoon » du partenaire ou des grands-parents</li> <li>la vaccination des professionnels travaillant avec des jeunes enfants</li> </ul>