CONCERNE VACCIN Rougeole-Rubéole-Oreillons

Chers Parents, Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si

la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents.

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents.

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre Rougeole, Rubéole et Oreillons. Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5°C ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.