Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccin **Rougeole-Rubéole-Oreillons**

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour contre le RRO.
Ne vous inquiétez pas s'il présente dans les 12 jours qui suivent une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur), une éruption cutanée ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.