Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.

Concerne Vaccins **Hexavalent R, Pneumocoque R et Méningocoque**.

Chers Parents,

Votre enfant a été vacciné ce jour (voir détail du carnet).
Il peut présenter dans les 48h une réaction locale discrète (rougeur, gonflement, douleur) ou de la fièvre. Il est conseillé de donner une dose de paracétamol si votre enfant a une température supérieure à 38,5c° ou semble avoir mal. Si vous constatez l'apparition d'autres symptômes inhabituels, ou si la fièvre persiste, nous vous recommandons de contacter votre médecin.